

Den modifierade versionen av PASS - SwePASS

| Delmoment | Skalsteg | Delmoment | Skalsteg |
|---|------------------|--|------------------|
| 1. Ryggliggande till sidliggande på afficierad sida Kan inte utföra aktiviteten Kan utföra aktiviteten med två personers hjälp Kan utföra aktiviteten med en persons hjälp Kan utföra aktiviteten utan hjälp | 0 1 2 3 | 7. Stående utan stöd Kan inte stå utan stöd Kan stå utan stöd i 10 sekunder eller belastar det ena benet kraftigt Kan stå utan stöd i en minut eller står lätt asymmetriskt Står symmetriskt utan stöd i över en minut och utför samtidigt armrörelser över skuldernivå; hand/händer i rörelse från panna till nacke, omväxlande med arm/armar hängande utmed kroppen | 0 1 2 3 |
| 2. Ryggliggande till sidliggande på icke afficierad sida Kan inte utföra aktiviteten Kan utföra aktiviteten med två personers hjälp Kan utföra aktiviteten med en persons hjälp Kan utföra aktiviteten utan hjälp | 0 1 2 3 | 8. Stående på icke afficierat ben Kan inte utföra aktiviteten Kan stå upp till 5 sekunder Kan stå mer än 5 sekunder Kan stå mer än 10 sekunder | 0 1 2 3 |
| 3. Ryggliggande till sängkantsittande åt icke afficierad sida Kan inte utföra aktiviteten Kan utföra aktiviteten med två personers hjälp Kan utföra aktiviteten med en persons hjälp Kan utföra aktiviteten utan hjälp | 0 1 2 3 | 9. Stående på afficierat ben Kan inte utföra aktiviteten Kan stå upp till 5 sekunder Kan stå mer än 5 sekunder Kan stå mer än 10 sekunder | 0 1 2 3 |
| 4. Sängkantsittande med fötterna i golvet, händerna i knät Kan inte utföra aktiviteten Kan sitta med lätt stöd, exempelvis med hjälp av egen hand Kan sitta utan stöd mer än 10 sekunder Kan sitta utan stöd i 5 minuter | 0 1 2 3 | 10. Stående, upplöckning av sko från golvet Kan inte utföra aktiviteten Kan utföra aktiviteten med två personer stöd Kan utföra aktiviteten med en persons stöd Kan utföra aktiviteten utan stöd | 0 1 2 3 |
| 5. Sängkantsittande till stående Kan inte utföra aktiviteten Kan utföra aktiviteten med två personers hjälp Kan utföra aktiviteten med en persons hjälp Kan utföra aktiviteten utan hjälp | 0 1 2 3 | 11. Stående till sängkantsittande Kan inte utföra aktiviteten Kan utföra aktiviteten med två personers hjälp Kan utföra aktiviteten med en persons hjälp Kan utföra aktiviteten utan hjälp | 0 1 2 3 |
| 6. Stående med stöd Kan inte stå, ens med stöd Kan stå med två personers stöd Kan stå med en person stöd Kan stå med enbart lätt stöd från en hand | 0 1 2 3 | 12. Sängkantsittande till ryggliggande Kan inte utföra aktiviteten Kan utföra aktiviteten med två personers hjälp Kan utföra aktiviteten med en persons hjälp Kan utföra aktiviteten utan hjälp | 0 1 2 3 |

Korrigerad version 2013-10-08

Utrustning: tidtagarur och sko/toffel.

Testet utförs med patienten barfota. Informera patienten om att bedömningen baseras på hans/hennes första försök vid varje delmoment. Använd tidtagarur vid delmoment 4 och 7-9 för bedömning av patients förmåga att kunna bibehålla en position enligt givna tidskriterier. I delmoment 1-3, 5-6 och 10-12 bedöms postural kontroll enligt givna kriterier för hjälp/stöd (taktill, verbal eller tillsyn). Den modifierade versionen av PASS, SwePASS, framtagen av Carina U Persson, Maria Edvinsson, Katharina Stibrant Sunnerhagen, Ulla Svantesson och publicerad i *J Rehab Med* 2011; 43:348-53, är en syntes av den franska originalversionen och den publicerade engelska versionen av the Postural Assessment Scale for Stroke Patients av Benaim C, Pérennou DA, Villy J, Rousseaux M, Pelissier JP publicerad i *Stroke* 1999; 30: 1862-1868.

För kontakt: Carina Persson, Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi, Rehabiliteringsmedicin, Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet carina.persson@neuro.gu.se, Sjukgymnastikheten/Östra, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg carina.persson@vgregion.se